

# AMIN-CO

Estratto di lievito idrosolubile proveniente da colture pure di *Saccharomyces cerevisiae*. Questo estratto di lievito è prodotto usando solo ingredienti naturali e controllando attentamente i processi di autolisi. E' ingrediente fondamentale per la crescita microbica in quanto fornisce aminoacidi essenziali ed altri fattori di crescita. Applicato alle piante diventa un'ottima fonte di cessione di aminoacidi liberi fondamentali nel processo di crescita, ispessimento cellulare, rafforzamento delle difese endogene della pianta.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

## CONFEZIONI

Sacco **1 KG**  
in cartone da 16 pezzi



COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)
Proteine Kjeldahl 69,19 % Umidità 6 % Ceneri 13,11 % pH (5% soluzione) 5,4 pH Fibra totale 2,64 % Carboidrati 7,27 % Calorie 308 kcal/100 g Grassi totali 0,27 %	POLVERE	
<b>VITAMINE</b> Biotina 27,6 mg/100 g Niacina 52,17 mg/100 g Acido pantotenico 84,15 mg/100 g Vitamina B1 – Tiamina 65,39 mg/100 g Vitamina B2 – Riboflavina 17,9 mg/100 g Vitamina B6 7,31 mg/100 g <b>MINERALI</b> Calcio 207,12 mg/100 g Cromo 3 ppm Rame 2,7 ppm Potassio 3,67 % Sodio 1,69 % Zinco 27,06 mg/100 g Piombo 0,4 ppm Arsenico 0,4 ppm Ferro 2,27 mg/100 g <b>PROFILO AMINOACIDICO % AMINOACIDI TOTALI- % AMINOACIDI LIBERI</b> Cisteina 0,606-0,281 Metionina 2,688-1,648 Acido Aspartico 7,216-1,377 Treonina 8,075-6,019 Serina 3,184-0,739 Acido Glutammico 8,235-2,619 Prolina 2,253-0,690 Glicina 3,753-0,700 Alanina 6,802-4,464 Valina 3,775-1,864 Isoleucina 3,347-1,835 Leucina 4,594-2,779 Tiroxina 1,618-0,068 Fenilalanina 3,630-2,051 Lisina totale 5,202-1,193 Istidina 2,642-2,274 Arginina 1,929-0,210		

COLTURA	INDUZIONE	DOSE	EPOCHE D'IMPIEGO
Orticole	Fonte aminoacidica	1,0 kg / ha	Fogliare, dopo il trapianto ed a metà ciclo produttivo.
Baby leaf	Fonte aminoacidica	0,5 kg / ha	Fogliare dopo l'emersione delle prime foglie vere. Dopo ogni sfalcio.
Frutticole	Fonte aminoacidica	0,6 kg / ha	Fogliare in fase di allegagione, e dopo in base alle esigenze della pianta.
Cereali	Fonte aminoacidica	0,5 kg / ha	Fogliare a fine levata inizio fioritura.

## AVVERTENZE

Non miscelare con antiparassitari a base di rame o zolfo.  
Conservare i prodotti in locali freschi ed asciutti lontano da fonti di calore.  
Il prodotto non ha carenza.